



MÉDERI
NUTRICIÓN INTEGRATIVA
mederinutricion.com

MEDERDIGEST



Descripción: Complemento alimenticio a base de enzimas y manzanilla.

Modo de empleo / dosis recomendada: Tomar de uno (1) a dos (2) comprimidos al día con un vaso de agua (250 mL), preferentemente con las comidas, o según recomendación de un profesional.

Presentaciones: Estuches de 45 y 90 comprimidos de 1.020 g.

Composición: Agente de carga (celulosa microcristalina), mezcla de enzimas digestivas Enzi-mix® (amilasa, proteasa, glucoamilasa, lipasa, celulasa, lactasa y pectinasa), betaína HCl, pepsina, papaína, bromelaína, extracto seco de flores de Manzanilla (*Matricaria chamomilla*), recubrimiento: Aquapolish® F Clear 099.28 MS (agente de recubrimiento: hidroxipropilmetilcelulosa, Antiaglomerantes: celulosa microcristalina y ácido esteárico), tripsina+quimiotripsina 6:1 y antiaglomerantes (sales magnésicas de ácidos grasos y AEROSIL® 200 F (dióxido de silicio)).

Condiciones de conservación: Conservar el envase bien cerrado en un lugar seco y fresco.





Ingredientes:

Ingredientes	1 comp.	2 comp.
Enzi-mix®	200 mg	400 mg
- Del cual:		
Amilasa	6.000 DU	12.000 DU
Proteasa	12.000 HUT	24.000 HUT
Glucoamilasa	8 AGU	16 AGU
Lipasa	450 FCC FIP	900 FCC FIP
Celulasa	1.200 CU	2.400 CU
Lactasa	2.000 ALU	4.000 ALU
Pectinasa	28 endo-PGU	56 endo-PGU
Betaína	150 mg	300 mg
Pepsina	70 mg (140.000 UI)	140 mg (280.000 UI)
Bromelaína	60 mg (72 GDU)	120 mg (144 GDU)
Papaína	60 mg (360.000 USP)	120 mg (720.000 USP)
E.S de flores de manzanilla	60 mg	120 mg
- Del cual:		
Apigenina	0,18 mg	0,36 mg
Tripsina+quimotripsina (6:1)	10 mg (28.000 USP)	20 mg (56.000 USP)

Advertencias: No superar la dosis diaria expresamente recomendada. Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto de una dieta equilibrada. Es importante mantener una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable. Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños.

Properties and potential applications:

La **manzanilla** ayuda a apoyar el tratamiento de molestias gastrointestinales como espasmos menores, distensión epigástrica, flatulencia y eructos.